



## RISOLUZIONE OIV-OENO 675D-2022

### MONOGRAFIE SPECIFICHE SULLE PROFISETINIDINE/PROROBINETINIDINE

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iv dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Specificazione dei prodotti enologici",  
 CONSIDERATO la risoluzione OIV-OENO 624-2022 "Aggiornamento della monografia sui tannini enologici" che descrive una monografia generale,  
 CONSIDERATA la necessità di creare monografie specifiche per ogni famiglia di tannini,  
 DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di aggiungere la monografia COEI-1-  
 PROFIS  
 al Codex enologico internazionale:

#### TANNINI ENOLOGICI

**Monografia specifica sui tannini enologici contenenti profisetinidine/prorobinetinidine**  
**Le profisetinidine/prorobinetinidine sono una sottoclasse di tannini condensati (anche detti proantocianidinici). Appartengono a questa sottoclasse i tannini estratti dal Quebracho e dall'Acacia spp.**

#### 1. Metodo per la determinazione dell'appartenenza alle sottoclassi

##### 1.1. Caratterizzazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)

###### 1.1.1. Principio

Questo metodo permette di verificare la presenza di componenti caratteristici dei tannini condensati del sottogruppo delle profisetinidine/prorobinetinidine e di misurarne la concentrazione totale. Si applica a preparati a base di tannini enologici dichiarati puri e che non contengono dunque tannini di piccola massa molecolare di famiglie o sottofamiglie (o classi) diverse.



## 1.1.2. Reagenti, strumenti e apparecchiatura

### 1.1.2.1. Reagenti

(+)-catechina (N. CAS 154-23-4)

Acqua ultrafiltrata (resistività: 18,3 MΩ·cm)

Acqua (grado HPLC)

Metanolo (grado HPLC)

Acido formico (grado HPLC)

### 1.1.2.2. Strumenti

Matraccio in vetro borosilicato da 100 mL

Filtri con pori del diametro di 0,45 µm

Siringa in plastica da 1 mL

### 1.1.2.3. Apparecchiatura

Bilancia tecnica con risoluzione di 0,01 g

Bilancia analitica con risoluzione di 0,1 mg

Vetreria volumetrica di classe A

Sistema cromatografico con rilevamento mediante spettrometria di massa composto da:

- pompa a gradiente binaria o quaternaria
- iniettore dotato di un loop da 10 µL
- rivelatore spettrofotometrico a lunghezza d'onda fissa di 280 nm
- colonna Eclipse Plus C 18 (ad esempio): 2,1 x 100 mm, granulometria 1,8 µm
- sorgente di ionizzazione ESI-SIM (Electro Spray Ionisation-Single Ion Monitoring)
- rivelatore spettrometrico di massa: analizzatore a quadrupolo time-of-flight (Q-TOF)

## 1.1.3. Preparazione di campioni e standard

Campioni: pesare circa 0,5 g di tannini enologici sulla bilancia analitica e annotarne il peso. Disciogliere i tannini enologici in 100 mL di acqua ultrafiltrata in un matraccio in vetro borosilicato da 100 mL e miscelare bene.

Preparazione delle soluzioni standard: preparare una soluzione di 10 mg di (+)-catechina in 50 mL di acqua ultrafiltrata corrispondente a una concentrazione di 200 mg/L. Diluire poi in acqua ultrafiltrata fino a ottenere concentrazioni di 5, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg/L.

Solvente A: acqua (grado HPLC) contenente 0,1% di acido formico.

Solvente B: metanolo contenente 0,1% di acido formico.



#### 1.1.4. Procedimento

Filtrare la soluzione del campione e le soluzioni standard con filtri Whatman da 0,45 µm (diametro dei pori) e analizzarle mediante cromatografia nelle seguenti condizioni indicate a titolo esemplificativo:

Volume iniettato: 10 µL della soluzione del campione o soluzione standard di (+)-catechina  
Rivelazione a 280 nm

Composizione del gradiente di eluizione: (tempo, % di solvente A)

0 min, 99,0%; 0,5 min, 94,0%; 20 min, 50,0%; 25 min, 0,0%; 32 min, 94,0% e 10 min per l'equilibrio

Velocità del flusso: 0,3 mL/min

Quantificazione e rilevamento dei componenti caratteristici dei tannini condensati del sottogruppo (sottoclasse) delle profisetinidine/prorobinetinidine mediante scansione ESI-SIM o rilevamento Q-TOF (ad esempio).

Tabella 1: Esempi di formula chimica e m/z delle diverse profisetinidine/prorobinetinidine (per il quebracho)

Composto	Formula chimica	m/z
<b>(+)-catechina</b>	C <sub>15</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>	290,1
<b>(-)-epicatechina</b>	C <sub>15</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>	290,1
<b>Dimeri fisetinidolo catechina-</b>	C <sub>30</sub> H <sub>26</sub> O <sub>11</sub>	562,1
<b>Trimeri fisetinidolo catechina-</b>	C <sub>45</sub> H <sub>38</sub> O <sub>16</sub>	834,2
<b>Tetrameri fisetinidolo catechina-</b>	C <sub>60</sub> H <sub>50</sub> O <sub>21</sub>	1106,3

Tabella 2: Esempi di formule chimiche e m/z delle diverse profisetinidine/prorobinetinidine (per l'acacia)

Composto	Formula chimica	m/z
(+)-catechina	C <sub>15</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>	290,1
(-)-epicatechina	C <sub>15</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>	290,1
(-)-epicatechina-3-O-gallato	C <sub>22</sub> H <sub>18</sub> O <sub>10</sub>	442,4
Dimeri fisetinidolo-gallocatechina	C <sub>30</sub> H <sub>26</sub> O <sub>12</sub>	578,1
Dimeri robinetinidolo-catechina	C <sub>30</sub> H <sub>26</sub> O <sub>12</sub>	578,1



Dimeri chalcan-flavani (gambirina)	$C_{30}H_{28}O_{12}$	580,1
Trimeri catechina-fisetinidolo-robinetinidolo o gallocatechina-fisetinidolo-fisetinidolo	$C_{45}H_{58}O_{17}$	850,2
Trimeri robinetinidoli-robinetinidoli-catechina o gallocatechina-fisetinidolo-robinetinidolo	$C_{45}H_{38}O_{17}$	866,2




Figura 1: Esempio di scansione ESI-SIM del quebracho




Figura 2: Esempio di scansione ESI-SIM dell'acacia

## 1.2. Conclusione

Un tannino enologico si considera appartenente alle profisetinidine/prorobinetinidine quando:

- il suo contenuto polifenolico totale è superiore al 65% (metodo gravimetrico dell'allegato 1 della monografia generale OIV-OENO 624-2022),
- il suo contenuto di profisetinidine/prorobinetinidine, misurato mediante il metodo HPLC, è superiore a 20 mg equivalenti (per i tannini di quebracho) e a 150 mg equivalenti (per i tannini di acacia) di (+)-catechina per grammo di tannini enologici.

## 2. Metodo di misurazione delle proprietà e funzionalità

I metodi e i criteri di conformità indicati di seguito sono applicabili solo quando la proprietà/funzione è dichiarata sul preparato di tannini.

### 2.1. Capacità antiossidante

#### 2.1.1. Principio



Determinazione della capacità antiossidante delle profisetinidine/prorobinetinidine volta a contribuire alla protezione dei mosti e dei vini dall'ossidazione.

## 2.1.2. Prodotti

### 2.1.2.1. Capacità antiossidante

DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazile): PM = 394,32

Trolox (acido 6-idrossi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carbossilico): PM = 250,29

Metanolo (99,9% vol.)

Lettore per micropiastre 96-well (FLUOstar Omega - BMG Labtech, ad esempio)

### 2.1.2.2. Consumo diretto di ossigeno (OCR)

Ethanolo (96% vol.) (N. CAS 64-17-5)

Acido tartarico: PM = 150,09 (N. CAS 87-69-4)

Cloruro di ferro (III) esaidrato: PM = 270,30 (N. CAS 7705-08-0)

Solfato di rame (II) pentaedrato: PM = 249,68 (N. CAS 7758-98-7)

Bottiglie in vetro trasparente dotate di sensori con una capacità di 0,75 L

Ossimetro NomaSens (ad esempio)

## 2.1.3. Procedimento

### 2.1.3.1. Capacità ossidante (test DPPH)

Soluzione di tannini enologici 0,15 g/L: disciogliere 37,5 mg di tannini enologici in 500 mL di soluzione di vino modello (acqua distillata, 12% vol. di etanolo, 4 g/L di acido tartarico e pH portato a 3,5). Se il valore dell'assorbanza fosse superiore a 1 potrebbe essere necessario diluire la soluzione di tannini enologici (in tal caso, includere la diluizione nel calcolo).

Soluzione di Trolox 1 mM: disciogliere 125 mg di Trolox in 500 mL di soluzione di vino modello (acqua distillata, 12% vol. di etanolo, 4 g/L di acido tartarico e pH portato a 3,5).

Curva di calibrazione: disciogliere 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 e 0,1 mL di soluzione di Trolox 1 mM in 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 0,9 mL di soluzione di vino modello. Queste quantità corrispondono rispettivamente a concentrazioni finali di 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 e 0,1 mM di Trolox.

Soluzione di DPPH  $6 \cdot 10^{-5}$  M: disciogliere 2,36 mg di DPPH in 100 mL di metanolo. La soluzione deve essere preparata fresca.



### 2.1.3.2. Consumo diretto di ossigeno (OCR)

Soluzione di tannini enologici 1 g/L: disciogliere 0,75 g di tannini enologici in 750 mL di soluzione di vino modello.

Soluzione di vino modello: disciogliere 4 g di acido tartarico, 2,25 mg di cloruro di ferro (III) esaidrato e 0,225 mg di solfato di rame (II) pentaedrato in 90 mL di etanolo e 660 mL di acqua distillata. Portare il pH a 3,5.

### 2.1.4. Test

#### 2.1.4.1. Capacità antiossidante

Misurare un bianco contenente unicamente il reagente DPPH (RB) a 515 nm introducendo 190  $\mu$ L di soluzione di DPPH (1.3.1) in tutti i pozzetti della piastra. Successivamente, aggiungere 10  $\mu$ L di soluzione di tannini enologici (campioni), acqua distillata (bianco) o la soluzione di Trolox per la curva (standard) nei pozzetti e misurare (MS) a 515 nm dopo 30 min.

**La figura 2 fornisce un esempio d'uso della piastra.**

La formula da applicare per il calcolo della capacità antiossidante è la seguente:

$$1) RB - MS = x$$

$$2) \text{capacità antiossidante (mg eq. Trolox per g di tannini)} = \frac{250,29 \text{ (mg)}}{0,15 \text{ (g)}} \times \frac{x-b}{a}$$

dove  $a$  e  $b$  corrispondono rispettivamente alla pendenza e alla costante della curva di calibrazione di Trolox: Assorbanza=  $f$  ([Trolox])  $\rightarrow$  Assorbanza=  $ax + b$

**In ogni caso, le profisetinidine/prorobinetinidine devono presentare una capacità antiossidante e nello specifico devono contenere più di  $450 \pm 50$  mg equivalenti di Trolox per grammo di tannini (estratto commerciale).**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	T 0.1	T 0.1	T 0.2	T 0.2	T 0.4	T 0.4	T 0.6	T 0.6	T 0.8	T 0.8	T 1	T 1
B	T 0.1	T 0.1	T 0.2	T 0.2	T 0.4	T 0.4	T 0.6	T 0.6	T 0.8	T 0.8	T 1	T 1
C	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11
D	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11
E	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11
F	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11
G	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11
H	Blank	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11

T = Trolox

OT = Oenological Tannins

Figura 3: Esempio di una piastra 96-well



### 2.1.4.2. Consumo diretto di ossigeno (OCR)

Saturare la soluzione di vino modello con 8 mg/L di ossigeno facendo gorgogliare l'aria per 10 min a 20-25 °C. Successivamente, aggiungere il tannino enologico alla soluzione di vino modello nelle bottiglie riempite fino a 0,75 L. Sigillare ermeticamente le bottiglie e agitare fino a completa omogeneizzazione.

1. Misurare l'ossigeno consumato ogni due giorni cominciando 1 h dopo il riempimento delle bottiglie.
2. Per determinare il tasso di consumo di ossigeno, seguire il procedimento mostrato in **figura 2**:
  - rappresentare il consumo di ossigeno in funzione del tempo,
  - rappresentare successivamente l'inverso dell'ossigeno consumato in funzione dell'inverso del tempo,
  - il tasso di consumo di ossigeno corrisponde all'inverso del coefficiente di pendenza:

OCR  $t_0$  mg di O<sub>2</sub> per L consumato al giorno e per g di tannini = 1/A, dove A è il coefficiente della pendenza

**In ogni caso, le profisetinidine/prorobinetinidine devono avere la capacità di consumare direttamente l'ossigeno e nello specifico devono essere in grado di consumare più di 0,10 ± 0,05 mg di O<sub>2</sub> al litro, al giorno e per grammo di tannini (estratto commerciale).**




Figura 4: Procedimento per determinare il tasso di consumo di ossigeno

### 2.2. Capacità antiossidativa



## 2.2.1. Principio

Determinazione della capacità antiossidante delle profisetinidina/prorobinetinidina volta a contribuire alla protezione antiossidante dei composti dei mosti e dei vini dall'attività laccasica.

## 2.2.2. Prodotti

Etanolo (96% vol.) (N. CAS 64-17-5)

Acido tartarico: PM = 150,09 (N. CAS 87-69-4)

Acetato di sodio: PM = 82,03 (N. CAS 6131-90-4)

Siringaldazina (4-idrossi-3,5-dimetossibenzaldeide azina): PM = 360,36 (N. CAS 14414-32-5)

Polivinilpolipirrolidone (PVPP) (N. CAS 25249-54-1)

Mosto botritizzato con attività laccasica

Acqua distillata (grado HPLC)

## 2.2.3. Procedimento

Soluzione di tannini enologici 2 g/L: disciogliere 200 mg di tannini enologici in 100 mL di soluzione di vino modello (acqua distillata, 12% vol. di etanolo, 4 g/L di acido tartarico e pH portato a 3,5).

Soluzione tampone 8,2 g/L: disciogliere 410 mg di acetato di sodio in 50 mL di acqua distillata.

Soluzione di siringaldazina 0,06 g/L: disciogliere 30 mg di siringaldazina in 500 mL di etanolo.

## 2.2.4. Test

1. Aggiungere 4 mL di mosto botritizzato a 1 mL di soluzione di tannini enologici in una provetta, che corrisponderà al campione.
2. Aggiungere 4 mL di mosto botritizzato a 1 mL di soluzione di vino modello in una provetta, che corrisponderà al controllo.
3. Dopo 4 minuti (esatti), aggiungere 0,8 g di PVPP in entrambe le provette (campione e controllo), agitare e centrifugare per 10 minuti a 8500 rpm.
4. Prelevare 1 mL del surnatante (del campione e del controllo), e introdurlo in 1,4 mL di soluzione tampone e 0,6 mL di soluzione di siringaldazina. Introdurre la miscela in una cuvetta di plastica per spettrofotometro (lunghezza cammino ottico 10 mm).
5. Misurare l'assorbanza a 530 nm una volta al minuto per 5 minuti (incluse le misurazioni al tempo 0).



6. Successivamente determinare l'attività laccasica e l'attività laccasica residua utilizzando le seguenti equazioni e la **figura 3**:

$$\text{Attività laccasica} = 46,15 \times \Delta A \text{ } \mu\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1} = 46,15 \times \Delta A \text{ UL}$$

$$\% \text{ di attività residua} = (\text{attività laccasica}_{\text{campione}} / \text{attività laccasica}_{\text{controllo}}) \times 100$$




Figura 5: Esempio della determinazione di  $\Delta A$

In ogni caso, le profisetinidine/prorobinetinidine devono presentare una capacità antiossidativa e nello specifico devono essere in grado di ridurre l'attività laccasica residua almeno del 40%. Questo valore è valido per mosti e vini contenenti meno di 5 UL (unità laccasi).

## 2.3. Stabilizzazione del colore

### 2.3.1. Principio

Determinazione della capacità delle profisetinidine/prorobinetinidine di stabilizzare il colore volta a promuovere l'espressione, la stabilizzazione e la preservazione del colore di mosti e vini rossi.

### 2.3.2. Prodotti

Etanolo (96% vol.) (N. CAS 64-17-5)

Acido tartarico: PM = 150,09 (N. CAS 87-69-4)



Malvidina-3-O-glucoside: PM = 528,87 (N. CAS 18470-06-9)

### 2.3.3. Procedimento

Soluzione di tannini enologici 0,8 g/L: disciogliere 80 mg di tannini enologici in 100 mL di soluzione di vino modello (acqua distillata, 12% vol. di etanolo, 4 g/L di acido tartarico e pH portato a 3,5).

Soluzione di malvidina-3-O-glucoside 0,1 g/L: disciogliere 10 mg di malvidina-3-O-glucoside in 100 mL di soluzione di vino modello (acqua distillata, 12% vol. di etanolo, 4 g/L di acido tartarico e pH portato a 3,5).

### 2.3.4. Test

1. Introdurre 0,75 mL di soluzione di tannini enologici e 0,75 mL di soluzione di vino modello in una provetta conica con tappo da 2 mL (di seguito: provetta), e conservarla al buio e a temperatura ambiente. Questa provetta verrà denominata " $T_0$ ".
2. Introdurre 0,75 mL di soluzione di malvidina-3-O-glucoside e 0,75 mL di soluzione di vino modello in una provetta, e conservarla al buio e a temperatura ambiente. Questa provetta verrà denominata " $M$ ".
3. Introdurre 0,75 mL di soluzione di tannini enologici e 0,75 mL di soluzione di malvidina-3-O-glucoside in una provetta, e conservarla al buio e a temperatura ambiente. Questa provetta verrà denominata " $T_M$ ".
4. Dopo 7 giorni, misurare l'assorbanza a 450, 520, 570 e 630 nm delle tre provette ( $T_M$ ,  $T_0$  e  $M$ ).
5. Sottrarre i valori dell'assorbanza di  $T_0$  a  $T_M$  per ottenere l'assorbanza evitando le interferenze dovute al colore "naturale" del tannino enologico.

$$A(T_M) - A(T_0) = A(T)$$

6. Successivamente, determinare le coordinate CIELAB ( $L^*$ ,  $a^*$  e  $b^*$ ) corrispondenti alla soluzione di tannini con malvidina-3-O-glucoside ( $T$ ) e la soluzione di malvidina-3-O-glucoside ( $M$ ) con il software gratuito MCSV (<https://www.unirioja.es/color/descargas.shtml>) o con un software equivalente.

Le formule da applicare per il calcolo dell'indice di copigmentazione sono le seguenti:

$$1) \Delta E_{ab} \cdot TS = \sqrt{(L^*_T - L^*_{W}) + (a^*_T - a^*_{W}) + (b^*_T - b^*_{W})}$$



$$2) \Delta E_{ab} \cdot CS = \sqrt{(L^*_M - L^*_{W}) + (a^*_M - a^*_{W}) + (b^*_M - b^*_{W})}$$

$$3) \text{Copigmentation Index (\%)} = 100 \times \frac{\Delta E_{ab} \cdot TS - \Delta E_{ab} \cdot CS}{\Delta E_{ab} \cdot CS}$$

**$\Delta E_{ab} \cdot TS$** : differenza totale di colore tra la soluzione di malvidina-3-O-glucoside contenente tannini commerciali (T) e una soluzione di colore bianco puro (W).

**$\Delta E_{ab} \cdot CS$** : differenza totale di colore tra la soluzione di malvidina-3-O-glucoside (M) e una soluzione di colore bianco puro (W).

Le coordinate CIELAB di una soluzione di colore bianco puro sono  $L^* = 100,00$ ,  $a^* = 0,00$  e  $b^* = 0,00$ .

**In ogni caso, le profisetinidine/prorobinetinidine devono essere in grado di stabilizzare il colore e nello specifico devono presentare un indice di copigmentazione superiore al  $3,0 \pm 0,5\%$  dopo 7 giorni.**

**Nota:** Il dosaggio può essere eseguito con metodi alternativi a tutti quelli descritti sopra purché siano stati sottoposti a validazione interna.

### 3. Bibliografia

- Sarneckis, C. J., Dambergs, R. G., Jones, P., Mercurio, M., Herderich, M. J., Smith, P. A., "Quantification of condensed tannins by precipitation with methyl cellulose: development and validation of an optimised tool for grape and wine analysis", *Australian Journal of Grape Wine Research*, 2006, vol. 12, pagg. 39-49.
- Vignault, A., González-Centeno, M. R., Pascual, O., Gombau, J., Jourdes, M., Moine, V., Iturmendi, N., Canals, J. M., Zamora, F., Teissedre, P.L., "Chemical characterization, antioxidant properties and oxygen consumption rate of 36 commercial oenological tannins in a model wine solution", *Food Chemistry*, 2018, vol. 268, pagg. 210-219.
- Vignault, A., Pascual, O., Jourdes, M., Moine, V., Fermaud, M., Roudet, J., Canals, J. M., Teissedre, P. L. Zamora, F., "Impact of enological tannins on laccase activity", *OENO One*, 2019, vol. 53, pagg. 27-38.
- Vignault, A., Pascual, O., Gombau, J., Jourdes, M., Moine, V., Canals, J. M., Teissedre, P. L., Zamora, F., "Recent advances of the OIV working group on oenological tannins in the study of the functionalities of oenological", *BIO Web of Conferences*, 2019, vol. 15, 02015.
- Vignault, A., Gombau, J., Pascual, O., Jourdes, M., Moine, V., Canals, J. M., Zamora, F., Teissedre, P. L., "Copigmentation of Malvidin-3-O-Monoglucoside by Oenological Tannins: Incidence on Wine Model Color in Function of Botanical Origin, pH and Ethanol Content", *Molecules*, 2019, vol. 24, pagg. 1-15.
- Vignault, A., Gombau, J., Jourdes, M., Moine, V., Canals, J. M., Fermaud, M., Roudet, J., Zamora, F., Teissedre, P. L., "Oenological tannins to prevent Botrytis cinerea damage in



grapes and musts: kinetics and electrophoresis characterization of laccase", Food Chemistry, 2020, vol. 316, 126334.

- Vignault, A., *Tanins œnologiques : caractéristiques, propriétés et fonctionnalités. Impact sur la qualité des vins*, tesi di dottorato dell'Università di Bordeaux e dell'Università Rovira i Virgili, 2019.