

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ZOLFO POLVERE 98,5%, di All. III fino al **31 dicembre 2023** ai sensi del Reg. 2022/1480 EU della commissione 7 settembre 2022.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Classificazione CLP
	7737	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98,5% S	23/03/1989	Zolfi ventilati Mannino S.p.A.	P102-P280; EUH401
Modifiche autorizzate:					
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Estensione alle colture</u>: melo, pero, cotogno, pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, nocciolo, ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee). - <u>Eliminazione delle colture</u>: floreali. - <u>Estensione alla taglia</u>: 250Kg - <u>Cambio nome da</u>: ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S 					
	15669	ZOLFO VENTILATO MCT	23/01/2013	Pasquale Mormino & figlio S.R.L.	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Estensione alle colture</u>: melo, pero, cotogno, pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee). - <u>Rinuncia taglia</u>: 1 Kg - <u>Estensione alla taglia</u>: 250Kg 					
	13244	ZOLFO VENTILATO STELLA	14/05/2009	Pasquale Mormino & figlio S.R.L.	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Estensione alle colture</u>: melo, pero, cotogno, pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee). - <u>Rinuncia taglia</u>: 1 Kg - <u>Estensione alla taglia</u>: 250Kg 					
	13603	ZOLFO SAIM DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98,5% MARCA BLEU	11/12/2006	S.A.I.M miniere di zolfo S.r.l	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Eliminazione della coltura</u>: nespolo - <u>Rinuncia taglia</u>: 1-20-50 Kg - <u>Cambio nome da</u>: ZOLFO SAIM DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA BLEU 					

	13194	ZOLFO MARCA BLEU 98,5%	11/03/2009	S.A.I.M miniere di zolfo S.r.l	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
5.		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Eliminazione della coltura: fragola, floreali e ornamenti</u> - <u>Rinuncia taglia: 1-20-50 Kg</u> - <u>Cambio nome da: ZOLFO MARCA BLEU 97%</u> 			
Modifiche autorizzate:					
6.	13191	ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98,5%	04/03/2006	Solfochimica S.r.l.	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
7.		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Estensione alla colture: melo, pero, coto, pesc, nectarina, albicocco, ciliegio, susini, mandorlo, nocciola, ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee)</u> - <u>Rinuncia taglia: 1-20-50 Kg</u> - <u>Cambio nome da: ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 93%</u> 			
Modifiche autorizzate:					
8.	13291	ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98,5% S	24/05/2006	Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.	P102-P280; EUH401.
Modifiche autorizzate:					
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Estensione alla colture: melo, pero, coto, pesc, nectarina, albicocco, ciliegio, susini, mandorlo, nocciola, ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee)</u> - <u>Rinuncia taglia: 1-20 Kg</u> - <u>Cambio nome da: ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 85% S</u> 			

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% S

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% S - Registrazione Ministero della Sanità n. 7737 del 23/03/1989

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100

Contenuto:
kg 5-10-25-250*

Partita n°

ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
C.da Corsa Cianciana (AG)
Tel. +39.0922.984545

Officina di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
C.da Corsa - Cianciana (AG)

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nucula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% S ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

* Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

ZOLFO VENTILATO MCT

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO VENTILATO MCT - Registrazione Ministero della Salute, N. 15669 del 23/01/2013

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro g. 98.5
Coformulanti q.b.a g. 100

Officina di produzione:

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
90018 Termini Imerese (Palermo)

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.

Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (Palermo)
Tel. +39 0918141004

Distribuito da:

Manica S.p.A.
Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
tel. 0464-433705

Contenuto:

kg 5-10-25-250*

Partita n°

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotofto, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotofto): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO VENTILATO MCT ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

* Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

ZOLFO VENTILATO STELLA

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO VENTILATO STELLA - Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, N. 13244 del 14/05/2009

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.

Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (Palermo)
Tel. +39 0918141004

Officina di produzione:

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
90018 Termini Imerese (Palermo)

Contenuto: Partita n°
kg 5-10-25-250*

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nucula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO VENTILATO STELLA ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

* Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

ZOLFO SAIM DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% MARCA BLEU

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO SAIM DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% MARCA BLEU- Registrazione Ministero della Salute, n. 13603 del 11/12/2006

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100
Contenuto:	Partita n°
kg 5-10-25	

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.

C.so A. Lucci, 121 - 80142 Napoli

Tel. & Fax 081/7142843 - e-mail: info@saimzolfo.it

OFFICINA DI PRODUZIONE:

S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L.

C.da Formusi (c/o Scalo Ferroviario) - 83011 Altavilla Irpina (AV)

Tel. & Fax 0825/991092- e-mail: stabilimento@saimzolfo.it

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO SAIM DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 98.5% MARCA BLEU ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvina bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ZOLFO MARCA BLEU 98.5%

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO MARCA BLEU 98.5% - Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 13194 del 11/03/2009

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.

C.so A. Lucci, 121 - 80142 Napoli

Tel. & Fax 081/7142843 - e-mail: info@saimzolfi.it

OFFICINA DI PRODUZIONE:

S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L.

C.da Formusi (c/o Scalo Ferroviario) - 83011 Altavilla Irpina (AV)

Tel. & Fax 0825/991092- e-mail: stabilimento@saimzolfi.it

Contenuto:
kg 5-10-25

Partita n°

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO MARCA BLEU 98.5% ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98.5%

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98.5% - Registrazione Ministero della Salute n. 13191 del 04/03/2006

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100

Contenuto:
kg 5-10-25

Partita n°

SOLFOCHIMICA SRL
Sede Legale Via Generale La Rosa - Ragusa (RG)
Sede Amministrativa Via Stesicoro 50/A Ragusa
Tel. 0932876364- Fax 0932874359

Stabilimento di produzione:
Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.
Contrada Corso 92012 Cianciana (AG)

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° a BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° a BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Erioide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 98.5% ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 98.5%

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 98.5% - Registrazione Ministero della Salute n. 13117 del 30/03/2006

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100
Contenuto:	Partita n°

CALTABELLOTTA SRL
Sede legale: Via Friddi 9 - 90025 Lercara Friddi (PA)
Tel. 0918251051

Officina di produzione:
Caltabelotta Srl – Via Friddi 9 – Lercara Friddi (PA)
(AG)

Contenuto:
kg 5-10-25

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotofigo, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotofigo): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 98.5% ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 maggio 2023

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98.5% S

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98.5% S - Registrazione Ministero della Salute n. 13291 del 24/05/2006

COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Zolfo puro	g. 98.5
Coformulanti q.b.a	g. 100

Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.
V Strada n. 15 - Zona Industriale
95121 Catania
Tel. 095 592016

Stabilimento di produzione:
Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l. - V Strada n. 15 - Zona Industriale - 95121 Catania

Contenuto: Partita n°
kg 5-10-25

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;
- una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersagliare rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchiolatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotoigno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotoigno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nectarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofoide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nucula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 98.5% S ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvina bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO